

ZWANGER SCHAP



**VERLOSKUNDIGEN
PRAKTIJK
GOUDA**

Ronsseweg 3b
2803 ZA Gouda
www.verloskundigenpraktijkgouda.nl

Je kunt ons ook volgen via social media.

📷 www.instagram.com/verloskundigenpraktijkgouda

f www.facebook.com/verloskundigenpraktijkgouda

Verloskundigenpraktijk Gouda bestaat uit drie kleine praktijken:
Antje, Caatje en Neeltje



TEAM ANTJE

- . Marije de Vos
- . Renate Vink-van den Broek
- . Mijke van Harten-Bont
- . Hannah Burggraaf

NAAM

KOMT OP BEZOEK BIJ ANTJE

ANTJE

Telefonisch spreekuur door assistente
maandag t/m donderdag 8:30 – 14:00 uur
maandagavond 18:00 – 21:00 uur*
vrijdag 8:30 – 11:30 uur*

T 0182 527251

**de avond en de vrijdag kunnen mogelijk komen te vervallen in vakantieperiodes*



**VOOR SPOEDGEVALLEN EN
DRINGENDE VRAGEN:
M 06 51372250**

Indien het 06-nummer niet bereikbaar is,
bel dan het Groene Hart Ziekenhuis:
T 0182 505050
en vraag naar praktijk Antje.

WELKOM

Antje heet je van harte welkom in haar praktijk. Zij draait op enthousiasme, ervaring en inzet van vier verloskundigen:

- . Marije de Vos
- . Renate Vink-van den Broek
- . Mijke van Harten-Bont
- . Hannah Burggraaf

Voor bevallingen en kraamvisites hebben we afwisselend dienst. Ook het spreekuur doen we beurtelings. We streven ernaar dat je met ieder van ons kennis hebt gemaakt tegen de tijd dat je gaat bevallen. Je kunt ook zelf aangeven wanneer je een van ons nog niet hebt ontmoet dan houden we daar tijdens het plannen van de afspraken rekening mee.

Naast de verloskundigen zijn er de praktijkassistentes die ons ondersteunen in ons werk.

Omdat we samenwerken met de Verloskundige Academies lopen er regelmatig verloskundigen-in-opleiding stage in onze praktijk. Zij vervullen

dezelfde taken als de verloskundigen tijdens spreekuur, bevalling en kraambed maar dat gebeurt altijd onder onze supervisie. Mocht je bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van een stagiaire dan kun je dit altijd aangeven.

WAT KUN JE VAN ANTJE VERWACHTEN

Respect speelt een belangrijke rol in de aanpak van onze praktijk. We werken met respect voor verschillen in cultuur en levensovertuiging, met respect voor de wensen van de ouders om te bevallen zoals zij dat willen. En met respect voor de natuur: we beschouwen zwangerschap en bevalling als gezonde, natuurlijke processen. We controleren en begeleiden die processen zorgvuldig en geven zo nodig advies. Ons streven daarbij is het gezonde verloop van zwangerschap, bevalling en kraambed te bevorderen en onnodig medisch ingrijpen te voorkomen. Constateren we risico's voor moeder of kind, dan verwijzen we door naar de huisarts, gynaecoloog of kinderarts. In zo'n geval is onze inzet om, op enige afstand, bij het verdere verloop van zwangerschap en bevalling betrokken te blijven.

Wij werken samen met de gynaecologen van het Groene Hart Ziekenhuis met wie we een goede relatie hebben. Aan hen dragen wij met een gerust hart de zorgverlening over mocht dat nodig zijn. Wij bezoeken je in het kraambed zo vaak als nodig.

Samen met jou en de kraamverzorgende bespreken we de eventuele problemen en wordt het beleid daarop afgestemd. Wij zijn als verloskundige medisch eindverantwoordelijk voor het verloop van het kraambed.

In de eerste week na de bevalling doen wij bij je thuis de hielprik bij de baby. In een laboratorium wordt dit bloed onderzocht op diverse zeldzame, maar ernstige aandoeningen. Het onderzoek is belangrijk. Snelle opsporing van deze aandoeningen kan zeer ernstige schade aan de lichamelijke en verstandelijke ontwikkeling voorkomen of beperken. De aandoeningen zijn niet te genezen, maar wel goed te behandelen, bijvoorbeeld met medicijnen of een dieet.

Ongeveer zes weken na de bevalling kun je gebruik maken van een nacontrole op de praktijk. Je mag daar zelf een afspraak voor maken bij de verloskundige die je graag nog een keer wilt zien. We blikken terug op de zwangerschap en bevalling en vragen hoe het met je gaat in de nieuwe situatie. Afhankelijk van lichamelijke klachten en/of psychisch niet wel bevinden volgt er gericht onderzoek of doorverwijzing.

Om onze kennis up to date te houden volgen we regelmatig nascholingen en hebben we overleg met andere verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, huisartsen en het laboratorium.

Ook zijn wij ingeschreven in het kwaliteitsregister van onze beroepsorganisatie KNOV.

Om te zorgen dat we je zo goed mogelijk kunnen begeleiden en begrijpen, vinden we een goede communicatie erg belangrijk. Toch kan het zijn dat je je in bepaalde zaken niet goed begrepen voelt. Wij zijn hier zelf altijd erg alert op, maar ook jij kunt dit natuurlijk aan ons kenbaar maken. Wij vinden het daarom fijn als je duidelijk je behoefte naar ieder van ons communiceert waardoor wij de zorg optimaal kunnen afstemmen op jouw behoefte. Er zijn vaak meerdere mogelijkheden om jou de optimale begeleiding te geven en dat mag je dus gerust aangeven, wij denken met je mee!

SPREEKUR

Op verschillende doordeweekse dagen houden wij spreekuur op afspraak. Naast het spreekuur in de onze praktijk in Gouda houden we iedere week op dinsdagochtend spreekuur in Moordrecht in de huisartsenpraktijk aan de Burgemeester Brandtstraat 56b. Dit spreekuur is ook bedoeld voor de zwangeren uit Gouderak. De praktijk ligt op loopafstand van de veerpont. Daarnaast streven we ernaar om iedere week in Gouda een avondspreekuur te houden.

WANNEER IS HET VERSTANDIG OM CONTACT OP TE NEMEN

- ▶ Bij ongerustheid over jezelf of de baby.
- ▶ Vaginaal bloedverlies.
- ▶ Regelmatige (pijnlijke) harde buiken of weeën of gebroken vliezen voor de 37e zwangerschapsweek.

WAT JE NIET MOET VERGETEN

Tijdens het eerste gesprek bij de verloskundige heb je veel informatie ontvangen. Wij zetten de belangrijkste zaken die je moet regelen nog even op een rijtje:

Bloedprikken

Tijdens de eerste controle krijg je een formulier mee waarmee je bloed kunt gaan prikken voor het standaard bloedonderzoek bij zwangeren. Dit kan op de verschillende locaties die aangegeven zijn op de achterzijde van het labformulier. De uitslagen krijg je van ons tijdens de tweede controle mits je minimaal twee weken daarvoor bloed hebt laten prikken. Bij afwijkende bloeduitslagen word je uiteraard eerder op de hoogte gebracht. Voor de bloedafname moet je een afspraak maken. Dit kan via www.ghz.nl/bloedafname.

Prenatale screening (op eigen verzoek) of prenatale diagnostiek

Tijdens de eerste controle heb je, indien gewenst, informatie gekregen over prenatale screening (de NIPT, 13 en 20 weken echo) of op indicatie over prenatale diagnostiek. Denk hier samen met je partner goed over na en lees de folders die je hebt meegekregen.

Als je interesse hebt in prenatale screening nodigen wij je uit voor een afspraak op het spreekuur voor verdere informatie.

Tijdens deze afspraak vertellen we ook meer over de logistiek omtrent de verschillende onderzoeken.

Als je in aanmerking komt voor prenatale diagnostiek (vlokkentest of vruchtwaterpunctie) en je wilt daar gebruik van maken, dan moet er op korte termijn een afspraak voor een intake-gesprek gemaakt worden in een academisch ziekenhuis, dit is doorgaans het LUMC in Leiden.

Kraamzorg

Rond de 12e week van de zwangerschap moet de kraamzorg aangevraagd worden. Neem contact op met je zorgverzekeraar om de kraamzorg te regelen. Je kunt bij de zorgverzekeraar het kraamcentrum van je keuze aangeven.

Kraamzorgaanbieders in de regio:

Kraamzorg de Waarden
T 0900 5722646
www.kraamzorgdewaarden.nl

Kraamzorg Naviva
T 088 7777 666
www.naviva.nl

De Kraamvogel
T 088 7788500
www.dekraamvogel.nl

RST Kraamzorg
T 0342-422324
www.rstzorg.nl

Erkenning van de baby en ouderlijk gezag

Als je niet getrouwd bent en je wilt dat de baby de achternaam van je partner krijgt, moet je partner de baby erkennen. Hiervoor moeten jullie samen naar het gemeentehuis. Het is dus het makkelijkst om dit vóór de bevalling te regelen, bij voorkeur voor de 24 weken zwangerschap. In geval van geregistreerd partnerschap is de erkenning automatisch geregeld.

Naast erkennen is het vaak ook wenselijk dat de vader het ouderlijk gezag over het kind krijgt. Met het ouderlijk gezag kan de vader beslissingen nemen over de opvoeding en verzorging van het kind. Hij mag dan ook 'rechtshandelingen' verrichten in naam van zoon of dochter. Bijvoorbeeld het zetten van een handtekening.

Kinderopvang

Het is goed om je zo vroeg mogelijk in de zwangerschap al te oriënteren op kinderopvangmogelijkheden.

ZWANGERSCHAPSCURSUSSEN

Mocht je in de zwangerschap meer ontspanning, beweging of informatie willen over de zwangerschap en bevalling dan verwijzen we je naar onze website voor het cursusaanbod in de regio.

Verloskundigenpraktijk Gouda organiseert regelmatig informatieavonden over de bevalling en over borstvoeding. Tijdens deze avonden ben je samen met je partner of met degene die je ondersteunt tijdens de bevalling welkom om meer informatie te krijgen over bevalling of borstvoeding. Voor de actuele data en tijden verwijzen we je naar onze website.



LEVEN VOELEN

Door middel van controles bij de verloskundige wordt het welzijn van jou en je baby goed in de gaten gehouden. Als moeder ben je echter de enige die de baby al daadwerkelijk 'kent' voordat hij of zij geboren is. Het is daarom ook belangrijk om je bewust te worden van het individuele bewegingspatroon van je baby. Iedere baby is anders en heeft zijn eigen ritme.

Zoals je na de geboorte aandacht, tijd en energie zult besteden aan het zorgen voor je baby, is het een goede gewoonte om ook in de zwangerschap dagelijks aandacht te besteden aan je baby. Wij moedigen je aan om al tijdens de zwangerschap elke dag wat tijd te besteden aan de bewegingen van je baby. Door deze goede gewoonte zul je hem of haar leren kennen.

Je baby krijgt alles wat het nodig heeft via de placenta. Zolang er zuurstof en voedingsstoffen worden aangeleverd, zal je baby energie hebben om te bewegen en te schoppen. Wanneer de placenta onvoldoende zuurstof en voedingsstoffen aan je baby kan geven, moet je baby energie sparen om te kunnen blijven groeien en zal het die energie niet kunnen stoppen in bewegen. Er zullen dan minder bewegingen voelbaar zijn.

Als je je onzeker voelt over vermindering of verandering in de bewegingen van je baby, is ons advies om je gedurende een uur in linkerzijligging goed te concentreren op de bewegingen. Wat hierbij kan helpen, is een rustige ruimte zonder afleiding. Ben je hierna niet gerustgesteld, neem dan nog diezelfde dag contact op met je verloskundige. Als je bezorgd bent over het voelen van minder leven, mag je hiervoor dan ook altijd het 06-nummer bellen.

Aan het einde van de zwangerschap neemt vaak niet de frequentie van het aantal kindsbewegingen af, maar worden de bewegingen van de baby vooral anders. Waar een baby eerst nog flink kon schoppen, zal deze aan het einde van de zwangerschap vooral nog schuiven en draaien. Neem ook aan het einde van de zwangerschap contact op met je verloskundige als je bezorgd bent over een afname van de kindsbewegingen.



GEZONDE VOEDING RONDOND ZWANGERSCHAP

Tijdens de zwangerschap is het belangrijk om een gezonde, gevarieerde voeding te gebruiken. Eten voor twee is helemaal niet nodig, maar er zijn wel belangrijke aandachtspunten.

Tijdens de zwangerschap is het aan te raden om gebruik te maken van een gezond dagmenu. Deze bestaat uit drie hoofdmaaltijden: ontbijt, lunch en warme maaltijd, waarbij tevens ruimte is voor (gezonde) tussendoortjes. Goede variatie is van groot belang en zorgt ervoor dat alle belangrijke voedingsstoffen bij moeder en kind binnenkomen.

Bij het gebruik van een vegetarische/veganistische voeding dien je extra alert te zijn op voldoende ijzer (groente, noten, aardappelen, ontbijtgranen en volkorenbrood en sommige vleesvervangers) en vitamine B12 (in zuivel en sommige vleesvervangers) in de voeding.

EXTRA AANDACHT VOOR:

Foliumzuur (vitamine B11)

Neem tabletten van 0.4 of 0,5 mg vanaf het moment dat zwangerschap gewenst is (minimaal 4 weken voor de zwangerschap) tot en met 10 weken zwangerschap. Foliumzuur speelt een belangrijke rol bij de vorming van het zenuwstelsel dat vanaf de eerste dag na conceptie wordt aangelegd.

Vitamine D

Het advies is om 10 microgram vitamine D per dag te slikken. Dit is zonder recept verkrijgbaar bij de apotheek of drogist en zit vaak in de zwangerschapsvitamines.

IJzer

Zorg ervoor dat je voldoende ijzer binnenkrijgt, bijvoorbeeld door volkorenbrood en vlees te eten. Tip: neem bij elke maaltijd vitamine C-rijke producten, zoals groente en fruit, want dan neemt je lichaam gemakkelijker ijzer op.

Vette vis

Eet twee keer per week vis waarvan minimaal één keer vette vis zoals Atlantische makreel, sardines, zalm en ansjovis. In vis zitten visvetten en met name het vetzuur DHA verlaagt het risico op vroeggeboorte, een laag geboortegewicht en is nodig om de hersenen van je kindje goed te laten groeien.

Waar moet je opletten bij het eten van vis:

Eet geen roofvissen zoals zwaardvis, paling, tonijn of koningsmakreel dit zijn grote vissoorten en bevatten daardoor meer kwik en dioxines. Eet geen rauwe of gerookte vis, of verhit deze eerst goed. Eet geen vacuüm-voorverpakte vis, of verhit deze eerst goed (uit blik of pot kan wel). Voorkeur is om DHA uit vette vis te halen. Wil je of kun je niet voldoende vis eten, dan kan je een vis- of algenoliesupplement slikken.

LET OP MET:

Cafeïne

Wees zuinig met cafeïnehoudende producten. Gebruik maximaal 200 mg cafeïne per dag. Dat staat gelijk aan maximaal 1 kopje koffie per dag. Andere cafeïnehoudende dranken, zoals cola of energiedrank bevatten ook veel suikers, dus gebruik deze liever niet.

Vermijd rauwe voedingsmiddelen

- ▶ vlees zoals biefstuk, tartaar, carpaccio.
- ▶ vleeswaren zoals filet american, ossenworst, rauwe ham, salami, chorizo, cervelaat, rosbief, theeworst. Het eten van rauw vlees kan toxoplasmose veroorzaken.
- ▶ rauwe groenten goed wassen.
- ▶ zachte kaas van rauwe melk (niet gebruiken wanneer er “au lait cru” op de verpakking staat).

Vitamine A

Lever bevat veel vitamine A. Gebruik daarom maximaal 1x een leverproduct als beleg per dag en vermijd voedingsmiddelen die verrijkt zijn met vitamine A zoals vruchtensappen. Teveel vitamine A is schadelijk voor de baby.

Voor uitgebreide informatie:

kijk op www.voedingscentrum.nl of download de app [ZwangerHap](#).

Soms kan begeleiding van een diëtiste gewenst of nodig zijn. Bijvoorbeeld bij een veganistisch eetpatroon, zwanger-

schapsdiabetes, overgewicht, obstipatie, ijzergebreeksanemie of hypertensie. Je verloskundige kan je hierover meer vertellen of neem direct zelf contact op met onze diëtiste.

JolijtDietist

T: 0683566040

E: jolijt@jolijtdietist.nl

www.jolijtdietist.nl

LEEFSTIJLADVIEZEN

Stemmingswisselingen

Door alle zwangerschapshormonen is het heel normaal dat je last hebt van stemmingswisselingen. Je lichaam werkt namelijk hard aan de ontwikkeling van je kind. Soms kun je daardoor zomaar in tranen uitbarsten, je ontzettend moe voelen of juist heel snel boos worden. Zorg dat je voldoende aan je rust toekomt. Ook bestaat er een kans dat je (lichte) depressieve klachten krijgt. Mocht je dit bij jezelf herkennen dan is het raadzaam om dit met iemand te bespreken. Ook wij denken graag met je mee naar de mogelijkheden om je hierbij te helpen/ ondersteunen.

Werk

Sommige werkomstandigheden kunnen zowel fysiek als mentaal belastend zijn. Luister goed naar je eigen lichaam, doe indien nodig een stapje terug, of werk in een iets rustiger tempo. Werk waarin je wordt blootgesteld aan trillingen, straling, chemische stoffen of infecties,

is niet bevorderlijk voor de gezondheid tijdens de zwangerschap. Dit geldt ook voor fysiek zwaar werk en onregelmatige werktijden. Als je met zulke werk-omstandigheden te maken hebt, overleg dan met je werkgever of ARBO-arts.

Sporten

Bewegen is gezond en bevordert een goede zwangerschap, bevalling en een vlot herstel. Blijf sporten zoals je gewend bent, mits je lichaam dit aankan. Vaak zul je merken dat je het beter volhoudt in een lager tempo. Liever geen sporten waarbij de kans bestaat iets tegen je buik te krijgen. Duiken wordt ontraden.

Mondverzorging

Blijf je tanden goed poetsen en flossen, ga één keer per half jaar naar de tandarts en/of mondhygiëniste. In de zwangerschap ben je gevoeliger voor ontstoken tandvlees. Dit geeft een verhoogd risico op een vroeggeboorte en problemen met je bloeddruk.

Seksualiteit

De beleving van intimiteit en seksualiteit tijdens de zwangerschap wisselt per persoon en per zwangerschap. Bij een normaal verlopende zwangerschap zijn er geen geboden of verboden ten aanzien van het hebben van gemeenschap. Je hoeft niet bang te zijn de zwangerschap in gevaar te brengen door het hebben van seks.

Zonnebank en sauna

Een verhoogde lichaamstemperatuur vroeg in de zwangerschap geeft mogelijk een iets grotere kans op een aangeboren afwijking van het kind. Tot 14 weken zwangerschap kun je daarom beter niet in de sauna gaan of onder de zonnebank. Later in de zwangerschap is het met name de warmte waar een zwangere onwel van kan worden, vooral als je lichaam er niet aan gewend is. De zonnebank kan een zwangerschapsmasker (een vlekkerige bruine verkleuring van het gezicht) veroorzaken. Dit kan ook gebeuren door langdurig zonnen.

Schadelijke stoffen en straling

Probeer in de zwangerschap contact met de volgende stoffen zo veel mogelijk te vermijden: verf op terpentinebasis, ongediertebestrijdingsmiddelen en chemicaliën. Van haarverf zijn tot nu toe geen schadelijke effecten bekend. Röntgenonderzoek, indien echt noodzakelijk, kan uitgevoerd worden als het apparaat zo laag mogelijk wordt ingesteld. Geef het dus aan als je zwanger bent.

Besmettelijke ziekten

Als je tijdens de zwangerschap een besmettelijke ziekte oploopt, kan dat gevolgen hebben voor de gezondheid van je ongeboren kind. Ben je in contact geweest met iemand die een kinderziekte heeft met vlekjes op de huid, zoals waterpokken, rodehond of de vijfde ziekte, of een andere besmettelijke ziekte, neem dan contact op met je verloskundige.

Ook het cytomegalovirus (CMV) kan schadelijk zijn voor je ongeborn kind. Dit virus komt vaak voor in speeksel en urine van kleine kinderen. Goede hygiëne is daarom belangrijk. Dit verkleint de kans dat jij een besmettelijke ziekte krijgt zoals een infectie met CMV. Denk bijvoorbeeld aan handen wassen (met zeep) na het afvegen van snotte-bellen en na het verwisselen van luiers. Ook is het niet verstandig om bestek en eten te delen, of de speen van je kind in je eigen mond te stoppen.

Kinkhoest

Kinkhoest is een besmettelijke ziekte die ernstige hoestbuien kan veroorzaken. Het is vooral gevaarlijk voor jonge baby's die nog niet zijn gevaccineerd. Vanaf 2020 krijgen vrouwen tijdens de zwangerschap een kinkhoestvaccinatie aangeboden. Hierdoor zijn baby's meteen vanaf de geboorte beschermd tegen kinkhoest. Deze vaccinatie wordt de 22 wekenprik genoemd. Voor meer informatie hierover en het maken van een afspraak verwijzen we je naar www.22wekenprik.nl.

Listeria en toxoplasmose

Naast de voedingsadviezen om listeria en toxoplasmose te voorkomen (zie 'voeding') is algemene hygiëne van belang, met name na contact met (jonge) dieren (zoals op een kinderboerderij), na het werken in de tuin, en bij het verschonen van de kattenbak.

Roken

Stop met roken. Het kind krijgt minder zuurstof door het (mee-)roken van de moeder. De doorbloeding van de placenta vermindert, waardoor het kind minder goed kan groeien en vaker te vroeg wordt geboren. Tijdens de eerste levensjaren heeft een kind, waarvan de moeder gerookt heeft in de zwangerschap, meer last van ziekten aan de luchtwegen. Wiegendood komt vaker voor in gezinnen waar gerookt wordt.

Alcohol

Gebruik van alcohol tijdens de zwangerschap geeft een grotere kans op aangeboren afwijkingen van het centraal zenuwstelsel, het hart, de nieren en het gezicht. Daarom wordt het gebruik van alcohol afgeraden vanaf de bevruchting tot en met de borstvoedingsperiode.

Drugs

Gebruik van harddrugs in de zwangerschap kan ernstige complicaties geven bij je baby. Ook softdrugs geven een gezondheidsrisico. Zowel hard- als softdrugs worden ontraden in de zwangerschap.

Medicijnen

Alleen in overleg met de arts gebruiken. Overleg met de verloskundige over het gebruik van zelfzorgmedicatie. Verdoving bij de tandarts kan geen kwaad.

Tenslotte: geniet van je zwangerschap!

BEVALLING



VOORBEREIDING EN BENODIGDHEDEN

Onafhankelijk van de plaats waar je wilt bevallen is het belangrijk dat als je 37 weken bent:

- ▶ **Het bed verhoogd is tot 80 cm.**
- ▶ Je matras aan een kant beschermd is met een matrasbeschermer of een bedzeil.
- ▶ Een koffertje klaar staat met spullen voor een overnachting voor jou en je baby in het ziekenhuis. Aangevuld met een verzekeringsbewijs, het dossier van de kraamzorg, foto-toestel en eventueel Dextro Energy of iets dergelijks.
- ▶ Het kraampakket in huis is.

Afhankelijk van de manier waarop je verzekerd bent, ontvang je in de loop van de zwangerschap een kraampakket van je verzekering. Als dit niet zo is, moet je deze zelf aanschaffen bij de thuiszorgwinkel, BabyPark, drogist of apotheek. In het informatieboekje van de kraamzorg kun je lezen wat de inhoud van dit pakket moet zijn.

Bedverhogers en een ondersteek zijn vanaf de 36e zwangerschapsweek kosteloos te leen bij Thuiszorgwinkel Vegro, Bodegraafsestraatweg 3 Gouda. Bij sommige kraamzorgaanbieders kun je verstelbare bedverhogers lenen (deze worden gratis thuisbezorgd). Het verhogen van je bed is noodzakelijk vanwege de arbeidsvoorwaarden voor kraamverzorgsters en verloskundigen.

Benodigdheden voor een thuisbevalling en graag bij het kraampakket klaar zetten:

- ▶ 2 emmers
- ▶ 2 vuilniszakken
- ▶ 10 gestreken hydrofiel luiers (in plastic zak verpakt)
- ▶ 1 warme (omslag)doek of deken voor de baby
- ▶ 2 metalen kruiken
- ▶ 2 babymutsjes
- ▶ 1 thermometer
- ▶ 1 po / ondersteek
- ▶ 1 goede lamp

Wij hebben een baarkruk, benodigdheden voor de bevalling en zuurstof bij ons. Zorg voor een warme kamer tijdens de bevalling, dat stimuleert de weeënkwiteit en is aangenaam voor je baby.

BEVALHOUDINGEN


De houding die je aanneemt tijdens de bevalling kan invloed hebben op de pijn die je ervaart tijdens de bevalling. Het regelmatig wisselen van houding kan de pijn verminderen en ook de vordering positief beïnvloeden. Naast liggen in bed zijn nog meer opties:

- ▶ Een wee staand opvangen, terwijl je wiegt met je heupen of leunt op een tafel of stoel.
- ▶ Op een krukje zitten of op een skippybal.
- ▶ Voorover hangen op de tafel of het aanrechtblad.
- ▶ Op je handen en knieën zitten bij rugweeën.
- ▶ Rondlopen.
- ▶ Onder de douche.
- ▶ Zitten op de baarkruk tijdens het persen.
- ▶ In bad. Bevallen in water kent veel voordelen, waaronder de natuurlijke vorm van pijnstilling, ontspanning tussen de weeën en de bewegingsvrijheid. Omdat niet iedereen thuis een geschikt bad heeft om in te bevallen is het ook mogelijk om een bevalbad te huren of te kopen. Meer informatie hierover vind je op onze website.

BEVALLING

In de laatste maanden van je zwangerschap kan de baarmoeder vaker gaan samentrekken, ook wel 'harde buiken' genoemd. Deze samentrekkingen zijn geen (voor)weeën en kondigen nog niet je bevalling aan. De bevalling begint meestal met weeën. Deze weeën zijn in het begin nog kort, onregelmatig en niet zo pijnlijk. Ze worden 'voorweeën' genoemd en maken de baarmoedermond soepeler (rijper). In deze fase kun je vaak nog doorgaan met waar je mee bezig bent. Als de weeën sterker en regelmatig worden en meer pijn gaan doen én als je baarmoedermond open gaat, is je bevalling echt begonnen. Een eerste bevalling duurt gemiddeld 12-16 uur, vanaf het moment dat de weeën elke 3-5 minuten komen.

Eén op de tien bevallingen begint niet met weeën, maar met het breken van de vliezen. Als de vliezen gebroken zijn, komen de weeën meestal binnen 24 uur op gang. Het kan echter ook nog 48 uur duren voordat de bevalling begint. Bijna alle bevallingen vinden plaats in de periode van 3 weken voor tot 2 weken na de uitgerekende datum, dus tussen zwangerschapsweek 37 en 42. Binnen deze periode kun je onder leiding van de verloskundige naar eigen keuze thuis of poliklinisch in het Groene Hart ziekenhuis bevallen. Zelfs tijdens de bevalling kun je nog beslissen waar je wilt bevallen.



Doen zich tijdens de bevalling complicaties voor, dan zorgen wij voor een goede overdracht naar de gynaecoloog in het Groene Hart ziekenhuis, daar zul je dan verder begeleid worden.

THUISBEVALLING

Zolang alles medisch in orde is, mag je thuis bevallen. Het is belangrijk dat er bij het bed voldoende ruimte is voor onze spullen. Tijdens de bevalling kun je het beste aan de linkerkant van het bed gaan liggen (gezien vanaf het voeten-einde) zodat de verloskundige links van het bed kan staan om je te helpen. Voor een thuisbevalling is het belangrijk dat er verwarming en goede verlichting is op de etage waar je wilt bevallen. Beval op een plek in huis waar vandaan vervoer naar het ziekenhuis goed mogelijk is.

POLIKLINISCH

Kies je voor een poliklinische bevalling, dan beval je in een GezinSuite in het Groene Hart ziekenhuis, Bleulandweg 10. Vooraf aanmelden bij het ziekenhuis is niet nodig.

Je moet er rekening mee houden dat poliklinisch bevallen meestal extra kosten met zich meebrengt, informeer hiernaar bij je verzekeringsmaatschappij.

Tijdens een poliklinische bevalling word je begeleid door je eigen verloskundige en een kraamverzorgster. Wanneer de bevalling normaal verloopt, zul je ongeveer 3 á 4 uur na de bevalling weer terug naar huis gaan.

Parkeren

De hoofdingang (draaideur aan de zijkant van het ziekenhuis) is op doordeweekse dagen open van 6:45 tot 21:00 uur. Op weekend- en feestdagen is deze open van 9:00 tot 21:00 uur. Als de hoofdingang gesloten is, kun je aanbellen bij de deur links van de hoofdingang. De toerit vanaf de Bleulandweg leidt je naar de hoofdingang, P1 en P2. De eerste slagboom geeft toegang tot ca. 60 parkeerplaatsen tegenover de hoofdingang (P1) en tot parkeergarage P2. Via de andere slagboom rijd je langs de hoofdingang en de haal- en brengzone om iemand af te zetten of op te halen. Je kunt hier maximaal twintig minuten parkeren.

Tip: Neem een 2 euromuntstuk mee voor het geval je een rolstoel wilt gebruiken.

De Gezin Suites bevinden zich op de vierde etage, afdeling C4 (volg de bordjes).

WANNEER BEL JE DE VERLOSKUNDIGE?

Wanneer je weeën hebt dan bel je de verloskundige zoals zij dat met jou heeft afgesproken tijdens het gesprek over de bevalling. Wanneer je moet bellen is vaak heel persoonlijk. Vaak komt het er op neer dat je belt als jij denkt dat je de verloskundige nodig hebt. Dat kan zijn omdat je iets wilt bespreken met haar, je vragen hebt of dat je je zorgen maakt. In dit soort situaties kan je jouw verloskundige altijd bellen.

Verder moet je ons altijd bellen met:

► **Tekenen van de bevalling als je nog geen 37 weken zwanger bent.**

► **Ongerustheid.**

► **Bloedverlies.**

Bij ruim bloedverlies zoals bij een menstruatie. Tijdens de bevalling is iets slijmerig bloedverlies normaal (het zogenaamde 'tekenen') en wordt veroorzaakt door het weker worden van de baarmoedermond. Aan het einde van de zwangerschap kun je de slijmprop verliezen (dat kan met of zonder iets bloedverlies zijn). Dit is meestal nog geen begin van de bevalling.

► **Vruchtwaterverlies en een ingedaald hoofd van de baby**

Als de vliezen overdag breken, bel dit dan direct even door. Als de vliezen 's nachts breken en het vruchtwater is helder van kleur, noteer dan de tijd en bel de volgende ochtend tussen 9.00 en 10.00 uur (tenzij je eerder weeën krijgt). Is het vruchtwater groen of bruin, bel dan altijd direct.

► **Vruchtwaterverlies en een niet-ingedaald hoofd van de baby.**

Als de vliezen breken, bel dan direct na het breken van de vliezen en ga liggen.



BORST VOEDING



INLEIDING

Veel vrouwen willen borstvoeding geven. Borstvoeding is een natuurlijk vervolg op de zwangerschap en bevalling. En net als alle andere dingen die je voor de komst van je baby voorbereid, is het belangrijk om je al tijdens de zwangerschap voor te bereiden op het geven van borstvoeding. Een goede voorbereiding zal de kans op een goed verloop van de borstvoeding vergroten. Weten hoe borstvoeding werkt is hiervan het begin.

Dit deel van het boekje geeft je een globale uitleg van de belangrijkste dingen die je moet weten over borstvoeding. Verdere informatie over borstvoeding kun je via allerlei manieren tot je nemen. Naast boeken en internet is het bezoeken van een informatiebijeenkomst een aanrader. Tijdens de borstvoedingsbijeenkomsten krijg je algemene informatie over borstvoeding en er is ruimte voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen met andere zwangeren en moeders. Kijk voor het actuele aanbod op onze website!

WAAROM IS BORSTVOEDING BELANGRIJK?

Borstvoeding is de beste voeding voor baby's. Het geven van borstvoeding levert voor moeder en kind gezondheidswinst op. De positieve effecten van borstvoeding staan hieronder kort samengevat:

Voor de baby

- ▶ Borstvoeding past zich aan naar de leeftijd en de behoeften van het kind. Borstvoeding is daarom niet na te maken en bevat alles wat een baby nodig heeft.
- ▶ Borstvoeding is direct beschikbaar, van juiste samenstelling en op de goede temperatuur.
- ▶ Op de lange termijn vermindert borstvoeding de kans op suikerziekte, hart- en vaatziekten en overgewicht.
- ▶ Borstvoeding zorgt voor een betere hersenontwikkeling.
- ▶ Het drinken aan de borst bevordert de kaakontwikkeling.
- ▶ Borstvoeding geeft actief bescherming tegen verschillende ziekten. Borstgevoede baby's hebben minder kans op:
 - maagdarminfecties
 - middenoorinfecties
 - luchtweginfecties en astma
 - bacteriële infecties
 - hersenvliesontsteking
 - allergieën en eczeem

Dit zorgt ervoor dat borstgevoede kinderen in het eerste levensjaar minder vaak worden opgenomen in het ziekenhuis.

De grootste gezondheidswinst is te behalen als kinderen minimaal 6 maanden uitsluitend borstvoeding krijgen, maar ook een korte periode borstvoeding geven levert altijd nog meer gezondheidswinst op dan geen borstvoeding.


Voor de moeder

- ▶ Borstvoeding geven bevordert het herstel van het lichaam, het beperkt het bloedverlies na de bevalling en maakt het voor de meeste vrouwen gemakkelijker weer op gewicht te komen.
- ▶ Het succesvol borstvoeding geven kan een positieve invloed hebben op het hechtingsproces van moeder en baby.
- ▶ Borstvoeding kan het zelfvertrouwen vergroten voor wat betreft het herkennen en ingaan op de signalen van de baby.
- ▶ Een langere periode borstvoeding geven verlaagt de kans op borst- en eierstokkanker voor de menopauze.
- ▶ Borstvoeding is altijd voorradig, het is goedkoop, het is hygiënisch en milieuvriendelijk verpakt.

DE PRODUCTIE VAN BORSTVOEDING

In de zwangerschap zijn je borsten bezig met de voorbereiding op de borstvoeding. Het melkklierweefsel neemt toe en ontwikkelt zich volledig. Het colostrum, dat vanaf halverwege de zwangerschap aanwezig is, is de eerste voeding die je borsten aanmaken. Dit is een gele vloeistof die veel afweerstoffen en eiwitten bevat en licht verteerbaar is. In het begin zal je kind mondjesmaat melk (rond 7 tot 14 ml per voeding) binnenkrijgen. Door vaak aanleggen, stimuleer je de borsten om meer te produceren totdat tussen de 2de en 4de dag de eigenlijke melkproductie op gang komt. Na ongeveer twee weken verdwijnt het colostrum uit de melk, waardoor het aanzien ook verandert. De melk ziet er witter en dunner uit, dit zegt niets over de hoeveelheid calorieën die de melk bevat. Alle benodigde voedingsstoffen en beschermende bestanddelen zitten erin in precies de juiste verhouding.

In de praktijk blijkt dat de hoofdoorzaak voor het stoppen met het geven van borstvoeding is, dat vrouwen denken dat ze te weinig melk hebben. Slechts twee procent van de vrouwen in de wereld kan onvoldoende melk produceren. Of een vrouw voldoende melk heeft of niet, heeft niets met de grootte van de borsten te maken.



Bepalend is de hoeveelheid melkklierweefsel dat op de volgende hormonen reageert:

Oxytocine zorgt ervoor dat de kleine spieren rondom de melkkliertjes samentrekken waardoor de melk eruit geperst wordt. Dit noemt men toeschietreflex en veel moeders voelen het als een kriebeling, een tinteling of een trekkerig gevoel. Ook laat oxytocine je lekker rustig en loom worden. Dit kan je helpen om 's nachts weer snel in slaap te vallen na een voeding.

Prolactine, dat de productie van borstvoeding verzorgt, kan pas na de geboorte van de placenta zijn werk beginnen. Zodra je kind aan de borst zuigt, komt het hormoon vrij. Het principe van de melkproductie is gebaseerd op vraag en aanbod: Hoe vaker je aanlegt, hoe hoger het prolactine-gehalte in het bloed wordt. Hierdoor zal de melkproductie snel op gang komen en onderhouden worden.



PRAKTISCHE ZAKEN OMTRENT BORSTVOEDING

Het eerste borstvoedingsmoment


Hoewel borstvoeding geven een natuurlijk proces is hebben de meeste moeders en baby's oefening nodig om met het voeden vertrouwd te raken. De oefening begint na de geboorte als je baby bloot tegen je aan ligt. Dit eerste, huid-op-huid, contact tussen moeder en kind is waardevol en bevordert de moeder – kind relatie. Direct na de bevalling zijn de meeste baby's rustig en alert. Binnen een uur zijn de aangeboren zoek- en zuig-reflexen van je baby het sterkst aanwezig en kunnen worden gebruikt. Een gezonde pasgeborene kan, als er tijd en ruimte gegeven wordt, zelf de tepel vinden door te kruipen op moeders buik. Het is belangrijk om gebruik te maken van dit moment en deze reflexen. Uiteraard volg je jouw moedergevoelens als je je baby daarbij wilt helpen. De kraamverzorgster of verloskundige is er om eventueel ondersteuning te bieden bij het aanleggen.

Neem de tijd en rust om aan te leggen. Geduld is een belangrijke factor. Direct aanleggen is niet een absolute voorwaarde voor het slagen van de borstvoeding. Als aanleggen door bijzondere omstandigheden niet mogelijk is kan hetzelfde ritueel op een later tijdstip plaats vinden.

Aanlegtechniek

Sluit aan bij de aangeboren reflexen van je baby en kijk goed naar onderstaande details. Bij een goede aanlegtechniek let je op het volgende:

- ▶ Je neemt een rustige en ontspannen houding aan.
- ▶ Je baby ligt goed gesteund met het lijfje tegen je aan en heeft ruimte om zijn hoofdje te bewegen.
- ▶ Je baby ligt met het lichaam en hoofd in een lijn naar de moeder.
- ▶ Je baby ligt tegenover de tepel, met zijn mond iets onder de tepelhof.
- ▶ Je wacht totdat het mondje wijd open is en trekt het hele lijfje van de baby in één beweging dicht tegen je aan.
- ▶ Je baby ligt met een iets opgeheven hoofd aan de borst.
- ▶ De neus van je baby raakt de borst.
- ▶ Tijdens de voeding blijft het mondje van je baby wijd opengesperd en glijdt niet op en neer over de tepelhof. De kin ligt vlak tegen de borst, de onderlip is naar buiten gekruld en de tong ligt gedurende de hele voeding over de onderkaak.
- ▶ Heel het mondje is gevuld met tepel, tepelhof en borstweefsel.



Let op:

- ▶ Het is je baby die naar de borst toegebracht wordt, niet de borst naar je baby!
- ▶ Het is niet de bedoeling dat de borst in de mond van je baby wordt geduwd.

Het is normaal dat je tepels de eerste 30-60 seconden van het voeden gevoelig of soms pijnlijk zijn. Na het toeschieten van de melk zakt dit gevoel. Als de gevoeligheid niet afzakt ligt de baby waarschijnlijk niet correct aan de borst. Haal dan je baby van de borst en probeer het aanleggen opnieuw totdat het voeden prettig aanvoelt. Na een poosje zullen je tepels gewend raken aan hun taak en zal ook de eerste pijn bij aanleggen minder worden of verdwijnen. Blijft het voeden pijnlijk vraag dan om deskundig advies.

Voor de toeschietreflex is het hormoon **oxytocine** nodig. Dit hormoon kan geactiveerd worden door het aanraken van en zuigen aan de tepel en door het zien of huilen van de baby. Eerst stromen de melkkanaaltjes vol totdat de melk spontaan uit de borst loopt of in sommige gevallen spuit. De toeschietreflex kan gemakkelijk verstoord of vertraagd worden als je onder stress staat, vermoeid bent of bij pijn en ongemak. Het is dus belangrijk om de tijd te nemen voor een voeding, in een aangename positie te zitten/licgen en zo min mogelijk storende prikkels (harde televisie, muziek of te veel bezoek) om je heen te hebben. Warme kompressen, zachte massage van de borsten en een goede, rustige ademhaling van de moeder kunnen als stimulans helpen.

VOEDINGSHOUDINGEN

Wanneer je je baby in één houding goed kunt voeden, zul je na enige oefening ook andere houdingen kunnen gebruiken. Het variëren van houdingen biedt als voordeel dat je baby de verschillende melkreservoirs in de borst goed kan legen. Enkele voedingshoudingen worden hieronder toegelicht.



Liggend op de zij voeden

Je ligt in zijligging op bed. Je baby ligt met zijn buik naar je toe. Deze houding geeft de gelegenheid om te rusten tijdens het voeden. Daarnaast kan deze voeding prettig zijn na een keizersnede. Het nadeel van deze houding is dat je minder overzicht hebt.



Voeden in zittende houding (madonnahouding)

Dit is de traditionele houding. Voordeel van deze houding is dat je veel overzicht hebt. Het lichaam van je baby ligt, ondersteund door je arm, voorlangs op je buik en ligt in een rechte lijn tegen je aan.



Liggend op de rug voeden

Je baby ligt op zijn buik op je of op een kussen naast je. Je steunt zo nodig het voorhoofd met je hand, zodat je baby niet met de neus in de borst zakt. Een baby kan in deze houding de aangeboren reflexen het makkelijkst gebruiken. Een voordeel van deze houding is dat de voeding rustiger verloopt doordat de zwaartekracht de krachtige melkstroom afzwakt.



Zittend voeden met de baby onder de arm (rugby- of bakerhouding)

Je houdt je baby onder je arm, het lijfje ligt in je zij en je ondersteunt het hoofdje. Deze houding is aan te bevelen bij te vroeg geboren baby's of na een keizersnede.

Een variant op deze houding is de 'doorgeschoven houding'. Deze houding wordt veelal in de eerste periode na de geboorte geadviseerd. Je kan in deze houding goed bijsturen. Je baby ligt op je rechterarm en je steunt het hoofdje ook met je rechterhand, terwijl je met je linkerhand je linkerborst aanbiedt.

Vraag en aanbod

Borstvoeding is een proces van vraag en aanbod. Het is daarom belangrijk om te voeden op verzoek. Dit wil zeggen dat je baby zo vaak en zo lang mag drinken als hij wil. De melkproductie komt goed op gang op het moment dat er frequent wordt aangelegd (de eerste dagen is 8-12 keer per 24 uur aanleggen heel normaal) en beide borsten per voeding worden aangeboden. Het bereiken van een evenwicht tussen vraag en aanbod kan wel een paar dagen duren.

Op ongeveer dag twee tot vier na de bevalling komt de melkproductie werkelijk op gang. Het op gang komen van de productie gaat gepaard met een grotere doorbloeding van de borsten. Stuwings van de borsten kan op dag drie á vier na de bevalling optreden. Gestuwde borsten voelen vol en gespannen aan. Door je baby op verzoek en op de juiste manier aan te leggen, is de stuwings vaak na een paar dagen grotendeels verdwenen. Je baby wil meestal frequent drinken tijdens de stuwings.

Gedurende de dagen dat de melkproductie op gang komt gebruiken baby's energie uit hun, speciaal daarvoor aangelegde, energievoorraden. Vaak valt een baby de eerste vier dagen af. Dit is een normaal proces, echter mag een baby niet te veel in gewicht afnemen. Wanneer het systeem van vraag en aanbod goed op elkaar is afgestemd stabiliseert het gewicht en neemt daarna geleidelijk toe.

Het is belangrijk dat je baby dag en nacht dicht bij je in de buurt is (rooming-in). Zo leer je de baby kennen. Je leert al snel de 'voedings-signalen' kennen, hiermee laat je baby merken dat het graag weer aan je borst wil drinken. Smakke lippen, het hoofd opzij draaien, op handen of vingers sabbelen, bewegen met de mond en de tong naar buiten steken zijn voedingssignalen. Als je wacht met aanleggen tot de baby huilt is het aanleggen moeilijker. Huilen is vaak het laatste signaal dat de baby geeft.

Door het gebruik van de fopspeen kunnen de voedingssignalen van de baby onderdrukt worden. Het kan zijn dat daardoor de baby minder effectief aan de borst drinkt. We adviseren daarom om voorlopig liever geen fopspeen of flesje te geven.

Hoe vaak en hoe lang voeden

Borstvoedingspatronen variëren per baby. Een patroon dat goed is voor de ene baby hoeft dat voor de andere baby niet te zijn. Een gezonde baby die goed drinkt zal op een natuurlijke manier het voedingsritme krijgen dat het meest geschikt voor hem/haar is. Niemand kan een moeder precies vertellen hoe vaak en hoe lang haar baby borstvoeding nodig heeft, of op welke leeftijd haar baby's nachts zal doorslapen. Daarom is borstvoeding geven een kunst en geen wetenschap. Te vaak aanleggen kan haast niet.

Baby's die borstvoeding krijgen kun je in principe niet overvoeden. De afnemer, jouw baby bepaalt immers hoeveel melk je maakt.

Door frequent aan te leggen ontstaan geen tepelkloven. Tepelkloven ontstaan meestal door een verkeerde aanlegtechniek.

Natuurlijk komt het voor dat een baby niet duidelijk aangeeft, dat hij wil drinken. In dat geval is het belangrijk dat je de baby minimaal 8 maal per dag voedt. Tijdens de kraamweek is vaker voeden heel gewoon. Er wordt geen maximum gelegd op het aantal voedingen.

Het komt ook voor dat een baby de hele dag door om een voeding lijkt te vragen. Dan is het belangrijk te onderzoeken of de baby wel effectief drinkt. Ook als je baby structureel een uur nodig heeft voor de voeding is het belangrijk om te kijken naar de aanlegtechniek.

Je baby krijgt genoeg voeding wanneer zij/hij:

- ▶ Zes tot acht natte luiers per etmaal heeft vanaf de vierde dag na de geboorte.
- ▶ De eerste zes weken drie tot vijf keer per etmaal mosterd-geel gekleurde ontlasting heeft. Vanaf week zes kan de frequentie van de ontlasting afnemen naar eens in de vier tot tien dagen.
- ▶ Zichzelf meldt voor een voeding.
- ▶ De borsten goed leeg drinkt; de borsten voelen na het voeden soepeler en leger aan.
- ▶ Een alerte en tevreden indruk maakt.
- ▶ Minimaal 100 gram per week aankomt. Wat voor jouw baby gezond is, is mede afhankelijk van het geboortegewicht.

Regeldagen

Regeldagen zijn dagen waarop de voedingsbehoefte van de baby onverzadigbaar lijkt. De vraag naar voeding is dan groter dan het aanbod, bijvoorbeeld omdat de baby hard groeit, of doordat de moeder een drukke of spannende tijd heeft gehad. Je borsten zijn dan letterlijk meer melk aan het regelen en dat voel je. Je baby wil vaker drinken en is minder tevreden na een voeding. Er zijn geen regels te geven over de momenten waarop deze dagen zich voordoen. Baby's kunnen nukkig zijn in deze periode, weinig slapen en veel huilen en soms zelfs moeite hebben met aanhappen. Neem vooral rust en probeer goed te drinken. Vaak aanleggen zorgt ervoor dat de productie weer op peil komt. Er is dan weer een nieuw evenwicht ontstaan.

Verzorgen van de borsten

Voor het geven van borstvoeding is het prettig dat je tepels soepel en elastisch zijn. De huid van de tepels is te vergelijken met die van je lippen. Het is belangrijk om de huid vet en soepel te houden. Je kunt je borsten beter niet grondig wassen met zeep, omdat zeep veel vet onttrekt aan de huid. De tepel en de tepelhof (de donker gekleurde huid rondom de tepel) verzorgen zichzelf door een stofje dat wordt uitgescheiden door de kliertjes in de tepelhof. In de borstvoedingsperiode is het voldoende de borsten te wassen met water. Het is belangrijk na de voeding de tepels goed te laten drogen aan de lucht. Verder kan het prettig zijn om na de voeding wat borstvoeding uit de borsten te halen en

over de tepels uit te smeren.

De witte bloedlichaampjes hebben een beschermende werking tegen bacteriën. Bij uitgedroogde, pijnlijke of kapotte tepels kan pure lanoline (wolvet) creme het genezingsproces bevorderen. Er zijn verschillende merken lanoline creme verkrijgbaar bij bijvoorbeeld thuiszorgwinkels, apotheken en sommige drogisterijen. Pure lanoline creme hoeft voor het voeden niet verwijderd te worden van de tepel. Verschoon geregeld je zoogcompressen. Bij gebruik van wasbare zoogcompressen is het verstandig deze op 60°C of warmer te wassen om groei van schimmels te voorkomen.

Leefwijze van de moeder

Het drinken van water naar behoefte is tijdens de borstvoedingsperiode erg belangrijk! Het advies is om minimaal 2 liter vocht per 24 uur te nuttigen. Daarnaast gebruik je ongeveer 500 kCal per dag extra. Op de site van het voedingscentrum vind je hier meer informatie over. In principe mag je alles eten als je borstvoeding geeft. De darmflora van de baby wordt in de eerste drie maanden opgebouwd. Als je gevarieerd eet zal de baby ook gevarieerde smaken leren kennen. Dit is een voordeel als de baby vast voedsel gaat eten. Wel kan het zijn dat door de voeding van de moeder de baby darmkrampjes krijgt. Darmkrampjes krijgen is een normaal proces bij baby's en gaat in principe vanzelf weer over. Bij vragen hierover; raadpleeg je verloskundige of het consultatiebureau.



BIJVOEDEN EN KOLVEN

Bijvoeden

Bijvoeding is het geven van andere voeding naast borstvoeding uit de borst. In principe heeft een gezonde voldragen baby geen andere voeding, naast borstvoeding, nodig. Hier kan van worden afgeweken indien dit medisch noodzakelijk is. Enkele redenen kunnen zijn:

- ▶ een wat kleine of jonge baby of juist een erg grote baby.
- ▶ een baby die 10% of meer is afgevallen ten opzichte van het geboortegewicht, of als de baby te veel dreigt af te vallen.
- ▶ tijdelijk medicijngebruik van de moeder, bij de meeste medicijnen kun je borstvoeding geven.

Uiteraard wordt elke situatie individueel beoordeeld. Mocht bijvoeding noodzakelijk zijn dan wordt de baby bij voorkeur bijgevoed met afgekolfd melk. De bijvoeding wordt liever niet met een fles gegeven. Dit is vanwege het feit dat het zuigen aan een speen een andere techniek vraagt dan het zuigen aan de borst. We laten deze mogelijke zuigverwarring bij de baby liever niet ontstaan. Daarom wordt bijvoeding toegediend met een spuitje of een cupje/ lepeltje. Mocht bijvoeding nodig zijn dan krijg je daarover instructie van de kraamverzorgende of verloskundige.

Kolven

De kans is aanwezig dat je gaat kolven als je borstvoeding geeft. Dit kan zowel in het kraambed of in de periode daarna. Als bijvoorbeeld de voeding nog op gang gebracht moet worden of als je weer gaat werken.

Met behulp van kolven wordt het zuigen van de baby nagebootst, de melk die begint te stromen wordt opgevangen in het flesje en kan op een ander moment gegeven worden aan de baby.

Het is niet nodig om al in de zwangerschap een kolf aan te schaffen. Indien nodig is deze snel genoeg in huis. Bovendien zijn er verschillende kolven, die ook voor verschillende doeleinden gebruikt kunnen worden. Zo zijn er handkolven en elektrische kolven. Welke kolf geschikt is, hangt af van hoe vaak gekolfd wordt, de reden dat er gekolfd wordt, de plaats waar gekolfd wordt en het beschikbare budget.

Als de melkproductie op gang gebracht moet worden is een (dubbelzijdige) elektrische kolf aan te raden. Je kunt deze het beste huren bij een thuiszorgwinkel. Een handkolf of een kolf met kleine motor is voor het op gang brengen van de melkproductie ontoereikend. Een elektrisch kolfapparaat is effectief en gemakkelijk in gebruik en is de aanschafprijs meer dan waard om met plezier (langere tijd) borstvoeding te kunnen blijven geven. Een handkolf is geschikt om af en toe te kolven.

Het is ook mogelijk om met de hand te kolven. Het voordeel hiervan is dat de toeschietreflex eerder gestimuleerd kan worden vanwege het huid- op huidcontact. Kolven met de hand vraagt vaak wel enige oefening. Als je de techniek onder de knie hebt, is afkolven met de hand snel en effectief.



Kolven met de hand kan op vele manieren. Een van de mogelijkheden is de volgende:

- ▶ Je laat de borst in je hand rusten met de vingers eronder en de duim erop, ongeveer op de rand van de tepelhof.
- ▶ Je duwt de borst naar je ribben toe; een zware borst zal je liever eerst wat oplichten.
- ▶ Je knijpt duim en vingers in een ritmische beweging samen, zodat je melkklieren en melkanalen leeg gedrukt worden. Het kan even duren voor de voeding begint te druppelen of lopen.
- ▶ Je verplaatst je hand regelmatig rond de borst en pauzeert even als er niet veel melk meer komt.

Bewaren en gebruiken van afgekolfd borstvoeding

De afgekolfd borstvoeding kun je bewaren in kunststof bakjes of in flesjes. Deze moeten van tevoren met kokend heet water uitgespoeld worden.

Locatie	Houdbaarheid
Kamertemperatuur	8 - 10 uur
Koelkast*	48 - 72 uur
Vriesvak koelkast	2 weken
Diepvriezer	3 - 6 maanden

* bewaar de melk achter in de koelkast

Het advies is om borstvoeding te ontdooien in de koelkast. Ontdooide borstvoeding mag niet opnieuw ingevroren worden en moet binnen 24 uur gebruikt worden. Het is in principe niet nodig om gekolfd borstvoeding voor het voeden te verwarmen. Je kunt het vanaf 1 uur voor de voeding buiten de koelkast op kamertemperatuur laten komen. Indien je het wel wilt verwarmen doe dit dan tot maximaal 35 graden Celsius bij voorkeur met behulp van een flessenwarmer of onder stromend warm water. Te heet verwarmen en het gebruik van de magnetron levert verlies van antistoffen en voedingsstoffen op.


Als borstvoeding geven niet de wens is of als dit niet gegeven kan worden, is het goed om te weten dat er alternatieven zijn om je baby te voeden. Het is mogelijk om donormelk te geven. Zie hiervoor www.moedermelknetwerk.nl.

Daarnaast bestaat er kunstvoeding. Kunstvoeding is meestal gemaakt van koeienmelk en verkrijgbaar als poeder in blik, of vloeibaar in kleinere hoeveelheden. Er zijn veel verschillende soorten en merken beschikbaar bij een drogisterij, supermarkt of apotheek. Alle in Nederland verkrijgbare kunstvoeding voldoet aan zeer strenge eisen waardoor je veilig kunt kiezen wat het meest geschikt en passend is in jullie situatie.

Er zijn veel verschillende soorten en maten flessen en spenen verkrijgbaar. Welke fles en speen voor jouw baby geschikt is moet je soms ervaren in de loop van de dagen. Het is in ieder geval een goed idee om - als je voor kunstvoeding, of voeden met een flesje kiest - alvast in het schap van de winkel te kijken en een setje voor een pasgeborene aan te schaffen.

Over hoe het voeden met een flesje werkt krijg je veel informatie van de (verpleegkundige en) kraamverzorgende in de eerste dagen na de geboorte. Het is belangrijk dat je baby met rust een aandacht gevoed kan worden. Bij voorkeur door een vaste persoon of een klein aantal vaste personen. Net als drinken aan de borst vraagt drinken uit een fles oefening en geduld. Bij voeden met een flesje kun je net als bij borstvoeding tijdens het voeden huid op huid contact toepassen, dit geeft vaak een prettig gevoel van geborgenheid.

Bij gebruik van kunstvoeding kun je grotendeels op verzoek voeden. Geeft je baby aan dat het voedingstijd is, dan kun je daar vaak in meegaan en voeding gaan geven. In dit geval is het wel belangrijk dat je niet boven de voor jouw baby vastgestelde hoeveelheid voeding per dag uitkomt.



WAT JE VAN ONZE BEGELEIDING KAN VERWACHTEN

- ▶ Meteen na de geboorte ligt je baby in principe bloot op bloot tegen je aan. We streven naar rust, zodat jullie als ouders alle tijd hebben om te genieten van dat bijzondere eerste uur met elkaar. Je pasgeborene baby voelt je warme huid en gaat vaak al op zoek naar de borst. Waarbij nodig geven wij of de kraamverzorgster ondersteuning bij het aanleggen. We streven er naar om je baby binnen een uur na de geboorte aan de borst te leggen.
- ▶ Tijdens de kraamperiode geven wij informatie over borstvoeding en ondersteunen wij je waarbij nodig. We streven er naar om de borstvoeding zo goed en prettig mogelijk te laten verlopen.
- ▶ Als er extra zorg nodig is bij het geven van borstvoeding maken wij, in samenspraak met jou en de kraamverzorgster, een passend plan voor de borstvoeding. Mocht dit onvoldoende zijn, dan adviseren wij je om contact op te nemen met een lactatiekundige. Zij zijn extra gespecialiseerd in de begeleiding bij borstvoeding.
- ▶ Na afloop van de kraamtijd dragen wij onze zorg voor je baby over aan het consultatiebureau. In principe zijn zij dan ook verantwoordelijk voor de borstvoeding. Tot ongeveer zes weken na de bevalling blijven wij ook beschikbaar voor het stellen van vragen.

Tenslotte: leer je baby kennen en neem de tijd...

Je borstvoeding staat of valt bij het wel of niet leren kennen van je baby. Kijk naar je kind en vertrouw op je eigen vermogen om borstvoeding te geven. De eerste weken is het vaak even doorzetten. Door de gebroken nachten zo vlak na de bevalling kan het soms zwaar voelen. Geef jezelf en de baby een week of 4 tot 6 om een evenwicht te bereiken en verwacht niet dat het meteen vlekkeloos loopt.

Samen met UNICEF en de WHO raden we je aan om de eerste zes maanden alleen borstvoeding te geven. Daarna heeft je baby ook ander voedsel nodig. Je kunt borstvoeding blijven geven zo lang als jij en je baby willen.

We wensen jou en je baby een goede borstvoedingsperiode!

NUTTIGE ADRESSEN

Moeders voor Moeders

www.moedersvoormoeders.nl

0800-0228070

Voedingscentrum

www.voedingscentrum.nl

Informatie over borstvoeding en voeding

Vierstroom

Thuiszorgwinkel Gouda/Vegro

Bodegraafsestraatweg 3, Gouda

0800 2887766

www.vegro.nl

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

www.minszw.nl

Informatie over wettelijke regelingen rond zwangerschap en zorgverlof en de periode van werken en borstvoeding.

Borstvoedingsvereniging

La Leche League

www.lalecheleague.nl

Borstvoedingorganisatie La Leche

League bieden informatie en ondersteuning aan iedereen die geïnteresseerd is in borstvoeding, of je nu zwanger of net bevallen bent, een oudere baby voedt of beroepsmatig met borstvoeding bezig bent.

Borstvoeding

www.borstvoeding.com

Producenten van borstkolven en andere borstvoedingsproducten:

Medela: www.medela.nl

Ardo: www.ardo.nl

Horigen: www.horigenborstkolf.nl

Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen

www.nvlborstvoeding.nl

Een lactatiekundige IBCLC is een borstvoedingspecialist. De Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL) geeft informatie over lactatiekundige in Nederland. Een lactatiekundige kan geraadpleegd worden bij vragen of problemen bij borstvoeding.



GEGEVENS

naam geboortedatum

a.t.: G/P: Bloedgroep Rhc

dag	datum	tijd	bloeddruk	gewicht	aantal weken	ligging	revisie	verloskundige	bijzonderheden

BIJZONDER HEDEN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bij verhindering graag tijdig afbellen. Wij zijn genoodzaakt om dit consult anders bij je in rekening te brengen.

Gelukkig zijn er de MAMAS



“Sabi viel huilend van de honger in slaap. Nu krijgt ze bij MAMA Ntish elke dag een gezonde maaltijd.”

In Zuid-Afrika leven veel kinderen in ernstige armoede. Gelukkig zijn er de MAMAS: sterke, indrukwekkende vrouwen die in actie komen. De MAMAS organiseren zélf dagelijkse zorg, bescherming, eten, warmte en vooral veel liefde.

De MAMAS ontfermen zich over de meest kwetsbare kinderen en helpen hen van geboorte tot aan hun eerste baan. Omdat ieder kind recht heeft op een betere toekomst.

Met €6 per maand helpen de MAMAS al één kind. Steun de MAMAS, ga nu naar www.kinderfondsmamas.nl

